

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE SAÚDE E TECNOLOGIA RURAL
CAMPUS DE PATOS - PB



HOSPITAL VETERINÁRIO

PROCESSO SELETIVO PARA PÓS-GRADUAÇÃO
***Lato Sensu* – RESIDÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA**
(VAGAS REMANESCENTES)

ATENÇÃO: Escreva no espaço indicado na sua FOLHA DE RESPOSTAS com sua caligrafia usual, a seguinte frase:

"Ser veterinário é cuidar da saúde dos animais e, sobretudo, amá-los"

DIA - 10/04/2022

CLÍNICA MÉDICA DE PEQUENOS ANIMAIS



**PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM MEDICINA VETERINÁRIA**

HOSPITAL VETERINÁRIO

CLÍNICA MÉDICA DE PEQUENOS ANIMAIS

GABARITO DO CANDIDATO

01	11	21	31
02	12	22	32
03	13	23	33
04	14	24	34
05	15	25	35
06	16	26	36
07	17	27	37
08	18	28	38
09	19	29	39
10	20	30	40

CLÍNICA MÉDICA DE PEQUENOS ANIMAIS

01) A síncope pode ser causada por alterações cardíacas e extracardíacas. Dentre as causas cardíacas cita-se aquelas de origem congênita, sendo a mais comum:

- a) Estenose subaórtica
- b) Degeneração mixomatosa da mitral
- c) Tetralogia de Fallot
- d) Cardiomiopatia dilatada canina
- e) Cardiomiopatia chagásica

02) Durante o exame auscultatório do coração o primeiro passo deve ser a determinação dos focos valvares pulmonar, aórtico, mitral e tricúspide. Tomando-se por base o ponto de máxima intensidade cardíaca, através do choque precordial, podemos considerar como correta a seguinte afirmação:

- a) O ponto de auscultação do foco mitral é anterior ao ponto de máxima intensidade cardíaca
- b) O foco aórtico fica em uma posição mais dorsal e cranial ao foco mitral
- c) O foco pulmonar está em uma posição mais dorsal e ventral ao foco aórtico
- d) O foco valvar tricúspide fica do lado direito na mesma posição do foco pulmonar
- e) O foco pulmonar está no hemitórax direito em uma posição mais ventral e cranial ao foco aórtico

03) O traçado eletrocardiográfico é composto por uma sequência de deflexões positivas e negativas identificadas pelas letras P, QRS e T. Assim consideramos como alternativa verdadeira:

- a) Que a onda P refere-se à fase de despolarização iniciada no nodo atrioventricular
- b) Que o intervalo PR indica o tempo utilizado pelo impulso elétrico para atravessar o nodo atrioventricular
- c) Que a onda Q indica a despolarização do septo interatrial
- d) Que a onda R é uma deflexão negativa que representa a despolarização do endocárdio ventricular
- e) Que o intervalo QT indica a repolarização ventricular através do infra ou supradesnívelamento do segmento.

04) Assinale abaixo a enfermidade cardíaca caracterizada por diminuição progressiva da contratilidade o que leva a uma redução do débito cardíaco e consequentemente sinais clínicos de insuficiência cardíaca congestiva:

- a) Degeneração mixomatosa de Mitral
- b) Tetralogia de Fallot
- c) Cardiomiopatia Dilatada
- d) Dirofilariose canina
- e) Hipertensão arterial pulmonar

05) A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é a principal cardiopatia dos felinos, causadora de mortalidade e morbidade na espécie. A principal alteração circulatória, de manifestação aguda, decorrente da dilatação do átrio esquerdo nesta enfermidade é:

- a) Edema pulmonar
- b) Síncope
- c) Tosse
- d) Tromboembolismo arterial sistêmico
- e) Taquicardia ventricular

No tocante ao exame neurológico de pequenos animais, analise as afirmativas a seguir:

I – Na avaliação do nível de consciência, verificamos que o estado de alerta ou de vigília é resultante de atividades cerebrais coordenadas pelo Sistema Ativador Reticular Ascendente (SARA)

II – A perda da coordenação motora é denominada de ataxia que pode ser classificada em cerebelar, cerebral e coclear

III – A paresia pode ser ocasionada por lesões no cérebro, tronco encefálico, medula ou nervos periférico

IV – Denomina-se como anisocoria a diferença de pigmentação existente entre as íris dos olhos de um animal

V – A porção vestibular do VIII par de nervos cranianos pode ser testada por meio de reação postural denominada aprumo vestibular

06) Assinale abaixo a alternativa correta:

- a) As afirmativas I, II e V são corretas
- b) As afirmativas II, III e IV estão corretas
- c) As afirmativas I, III e V estão corretas
- d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
- e) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas

07) A manifestação dos sinais clínicos inclinação da cabeça, quedas, rolamento, andar em pequenos círculos e nistagmos é indicativo de:

- a) Síndrome mesencefálica
- b) Síndrome cerebelar
- c) Síndrome cerebral
- d) Síndrome hipotalâmica
- e) Síndrome vestibular

08) Um cão sem raça definida, com 10 anos de idade foi levado ao Médico Veterinário manifestando os sinais clínicos de falta de atenção, perambulação a esmo e sem rumo, andar em círculos, incontinência urinária e fecal, perda de audição, vocalização excessiva e perda do reconhecimento do seu tutor e do ambiente em que sempre viveu. Os sinais iniciaram há seis meses de forma discreta, mas que estão se intensificando. Tais achados, apesar de inespecíficos, são indicativos de(a):

- a) Síndrome de disfunção cognitiva
- b) Leucodistrofia
- c) Degeneração neuronal multissistêmica
- d) Hidrocefalia congênita
- e) Encefalopatia hepática

09) No tocante às meningoencefalites virais é correto afirmar que:

- a) O diagnóstico definitivo é obtido através de exames de imagem
- b) O uso de medicamentos antivirais específicos é o tratamento de eleição para as encefalites virais
- c) Convulsão é um achado clínico específico na encefalite por FIV
- d) A pseudo-raiva é causada pelo paramixovírus e acomete cães e gatos
- e) Cães jovens (menos de 1 ano) com cinomose desenvolvem sinais de disfunção do prosencéfalo

10) Um paciente que manifesta relaxamento do esfíncter anal com descarga de material fecal a intervalos irregulares é portador de:

- a) Tenesmo
- b) Constipação intestinal
- c) Diarreia
- d) Incontinência fecal
- e) Hematoquezia

11) Para o tratamento da úlcera gástrica assinala abaixo o fármaco indicado para se aderir às lesões, formando uma camada protetora, aumentando a velocidade de cicatrização da úlcera:

- a) Pantoprazol
- b) Lansoprazol
- c) Misoprostol
- d) Cisaprida
- e) Sucralfato

12) A fluidoterapia é principalmente usada para tratar choque, desidratação e distúrbios eletrolíticos e acidobásicos. Sendo assim é correto afirmar:

- a) A solução salina hipotônica pode ser usada para tratar choque endotóxico ou hipovolêmico severo.
- b) A administração de fluidos via subcutânea (SC) é aceitável no animal em choque, podendo ser administrado repetidamente.
- c) Animais desidratados que não estejam em choque são tratados com a reposição do déficit de fluido estimado.
- d) Cães em choque devem receber no máximo 50mL/kg de cristalóides isotônicos intravenosamente na primeira hora, afim de evitar super-hidratação.
- e) O desenvolvimento de crepitações pulmonares expiratórias, ritmo de galope ou edema, indica hipocalcemia, sendo necessária a administração de gliconato de potássio por via intravenosa.

13) Antieméticos são indicados para terapia sintomática em muitos animais com vômito agudo ou nos quais o vômito está contribuindo para a morbidade, sendo os fármacos de ação central os mais confiáveis. Desta forma, assinale abaixo o fármaco antiemético de ação central cujo mecanismo de ação baseia-se no antagonismo ao receptor da neuroquinina-1 (NK-1):

- a) Atropina b) Maropitant c) Metoclopramida d) Ondansetrona e) Clorpromazina

14) Um cãozinho de dois meses de idade foi atendido numa clínica veterinária com queixa de, segundo o tutor, comer e em seguida colocar tudo para fora. O tutor observou este comportamento quando substituiu a dieta a base de papinha por ração comercial extrusada. O animalzinho está ativo, toma água e leite normalmente. O estado geral do paciente é bom, mucosas normocoradas, fezes normais, ausculta cardíaca e respiratória sem alterações e está normotérmico. Foi solicitado uma endoscopia digestiva onde visualizou-se unicamente estreitamento extramural próximo a base do coração. Diante destes achados sugere-se como diagnóstico clínico e exame diagnóstico confirmatório:

- a) Gastrite – fazer ultrassonografia abdominal
b) Esofagite – fazer nova endoscopia digestiva
c) Obstrução esofágica por corpo estranho – fazer radiografia cervical
d) Persistência do quarto arco aórtico direito – fazer esofagograma constrastado
e) Hérnia de hiato – fazer radiografia simples

15) Existem diversos tipos de gastrite crônica, que apresentam sinais de hiporexia e vômitos mais comumente em cães que em gatos. Assinale abaixo o tipo de gastrite que representa uma reação alérgica alimentar e que desta forma responde bem a eliminação da dieta causadora:

- a) Gastrite eosinofílica
b) Gastrite linfoplasmocítica
c) Gastrite atrófica
d) Gastrite granulomatosa
e) Gastrite por *Helicobacter pylori*

16) Um paciente canino da raça Yorkshire, adulto, com vacinas e vermifugação atualizadas, em bom estado geral, alimentando-se bem, foi atendido numa clínica veterinária com histórico de estar há aproximadamente cinco meses com tosse alta (sonora) que piora após exercício físico e quando a coleira pressiona o pescoço. As mucosas estão róseas, temperatura corporal de 38,5°C, Frequência cardíaca de 120 bpm e respiratória de 40mpm. Diante destes achados é possível presumir como hipótese diagnóstica:

- a) Colapso de traqueia
b) Traqueobronquite infecciosa
c) Pneumonia bacteriana
d) Megaesôfago
e) Bronquite

17) Um gato de dois anos de idade foi levado ao Médico Veterinário após ter sofrido atropelado por uma bicicleta. Ao exame físico o animal apresentava as mucosas levemente cianóticas, dispneia, padrão respiratório restritivo e abafamento dos sons respiratórios à auscultação. Foi solicitado radiografia torácica onde evidenciou-se a presença de líquido livre no tórax, sendo assim encaminhado o animal para punção e análise citológica deste. Na análise citológica observou-se um exsudato asséptico com moderada concentração de proteína (2,5g/dL) e baixa contagem de células nucleadas. Também foi realizada análise bioquímica do líquido onde observou-se elevada concentrações de triglicérides. Com base nestes resultado pode-se diagnosticar este paciente com:

- a) Piorótórax b) Penumotórax c) Quilotórax d) Contusão pulmonar e) Edema pulmonar

18) Um paciente acometido de edema pulmonar causado por hipoalbuminemia necessita como tratamento inicial:

- a) Furosemida e fluidoterapia isotônica
b) Oxigenioterapia e metilxantinas
c) Oxigenioterapia e infusão de coloides
d) Furosemida e acetilcisteína
e) Furosemida e corticóides

19) Para cães com sinais clínicos leves de pneumonia bacteriana podemos iniciar o tratamento com qual tipo de antibiótico, enquanto não sai os resultados do teste de sensibilidade antimicrobiana?

- a) Doxiciclina
- b) Gentamicina
- c) Trimetoprima
- d) Amoxicilina-clavulanato
- e) Penicilina

20) Em um paciente canino com glaucoma assinala o procedimento diagnóstico utilizado para avaliação do ângulo iridocorneano e da abertura da fenda ciliar:

- a) Eletroretinografia
- b) Tomografia
- c) Gonioscopia
- d) Tonometria
- e) Ultrasonografia ocular

21) A administração crônica de agentes quimioterápicos em doses relativamente baixas e minimamente tóxicas sem longos períodos livres da administração de medicamentos é a base da seguinte terapia oncológica:

- a) Quimioterapia metronômica
- b) Quimioterapia alquilante
- c) Quimioterapia de baixas doses
- d) Quimioterapia antimetabólica
- e) Quimioterapia hormonal

22) Dentre os fármacos antineoplásicos abaixo, assinala aquele cujo mecanismo de ação ocorre na fase S do ciclo celular, sendo assim considerado como seletivo para fase do ciclo celular:

- a) Doxorubicina
- b) Metotrexato
- c) Vincristina
- d) Prednisona
- e) Clorambucil

23) Sobre o Diabetes Mellito em felinos é correto afirmar:

- a) Os sinais clínicos se desenvolvem quando a hiperglicemia provoca a glicosúria, de acordo com o estado funcional das ilhotas pancreáticas.
- b) O Diabetes Mellito ocorre predominantemente em fêmeas não castradas, idosas, não havendo predisposição racial.
- c) A obesidade é achado raro em gato diabético pois o mesmo não ingere calorias de forma excessiva.
- d) O gato diabético apresenta as manifestações clássicas no exame físico mesmo sem ter cetoacidose.
- e) O diagnóstico da doença é semelhante para os cães e gatos, baseando-se na identificação dos sinais clínicos, hiperglicemia persistente e glicosúria.

24) Muitos fatores afetam as concentrações basais do hormônio tireóideo e TSH endógenos. Assinala abaixo o fármaco que usado continuamente pode resultar em menor concentração basal do hormônio tireóideo em cães eutireóideos:

- a) Diazepam
- b) Fenobarbital
- c) Cetoprofeno
- d) Amoxicilina
- e) Cefalexina

25) No paciente portador de Doença Renal Crônica o desenvolvimento de acidose metabólica deve-se a:

- a) Diminuição da excreção renal de amônio
- b) Aumento da excreção de carbonato de cálcio
- c) Aumento da excreção de eritropoietina
- d) Retenção de fósforo
- e) Diminuição da excreção de gastrina

26) O uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) leva à inibição de enzimas que degradam o ácido araquidônico, ciclooxigenase (COX) e lipoxigenase (LOX), as quais são responsáveis pela liberação de diversos tipos de eicosanóides com atividades fisiológicas distintas. O efeito antitrombótico obtido com o uso de AINE com ação inibitória da COX, deve-se à não formação do seguinte eicosanoide:

- A) Prostaglandina E₂
- b) Prostaciclina
- c) Lipoxina
- d) Tromboxano
- e) Leucotrienos

27) Assinale abaixo o AINE classificado como um inibidor de dupla ação, atuando tanto sobre a COX quanto sobre a LOX:

- a) Diclofenaco
- b) Cetoprofeno
- c) Ácido acetilsalicílico
- d) Ibuprofeno
- e) Meloxicam

28) A maioria dos patógenos do sistema genitourinário pode adentrar o trato urinário e ascender pela uretra até a bexiga urinária, o que corresponde a aproximadamente 95% das infecções, pois em condições normais há bactérias presentes na uretra distal e na região externa periuretral. Partindo desta afirmativa, assinale abaixo a alternativa que representa uma alteração no hospedeiro que pode predispor ou perpetuar a infecção do trato urinário:

- a) Quimioterapia
- b) Fator de virulência da bactéria
- c) Ureter ectópico
- d) Imunossupressão
- e) Hipertireoidismo

29) Dentre os antibióticos abaixo relacionados assinale aquele cujo mecanismo de ação se baseia na inibição da síntese da parede celular microbiana:

- a) Doxiciclina
- b) Cefalexina
- c) Sulfametoxazol
- d) Gentamicina
- e) Nistatina

30) No tratamento de um cão portador de conjuntivite por *Pseudomonas aeruginosa* indica-se colírio à base do seguinte antimicrobiano:

- a) Cefalotina
- b) Estreptomicina
- c) Rifamicina
- d) Sulfametoxazol
- e) Tobramicina

SAÚDE PÚBLICA

31) A portaria de consolidação nº4, de 28 de setembro de 2017, dispõe sobre a consolidação das normas relacionadas aos sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde. Quanto ao disposto nesta portaria sobre os sistemas de vigilância em saúde, estes podem ser divididos em:

- a) Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária
- b) Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados e o Sistema Nacional de Transplantes
- c) Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública e o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados
- d) Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e o Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública
- e) Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária

32) Quanto ao anexo III, capítulo I, da portaria de consolidação nº4, que trata dos princípios gerais das ações e Serviços de Vigilância em Saúde. É sabido que as ações de Vigilância em Saúde abrangem toda a população brasileira e envolvem práticas e processos de trabalho. Com base nisto, podemos afirmar que algumas destas práticas são voltadas para:

- I - A vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis;
- II - A vigilância das doenças crônicas não transmissíveis, dos acidentes e violências;
- III - A vigilância de populações expostas a riscos ambientais em saúde;
- IV - A vigilância da saúde do trabalhador;
- V - Vigilância sanitária dos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos, serviços e tecnologias de interesse a saúde.

Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Somente I, II, III e IV estão corretas
- b) Somente I, II e IV estão corretas
- c) Somente II e III estão corretas
- d) Todas estão corretas
- e) Somente II e V estão corretas

33) Ainda sobre a referida portaria (nº4), em seu anexo II, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (SISLAB). Este é um conjunto de redes nacionais de laboratórios, organizadas em sub-redes, por agravos ou programas, de forma hierarquizada por grau de complexidade das atividades relacionadas à vigilância em saúde - compreendendo a vigilância epidemiológica e vigilância em saúde ambiental, vigilância sanitária e assistência médica. Quanto ao SISLAB, sabe-se que ele é constituído por quatro redes nacionais de laboratórios, sendo elas:

- I - Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Epidemiológica;
- II - Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância em Saúde Ambiental;
- III - Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância saúde do trabalhador;
- IV - Rede Nacional de Laboratórios de Assistência Médica de Alta Complexidade.

Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Somente I, II estão corretas
- b) Somente I, II e IV estão corretas
- c) Somente II e III estão corretas
- d) Todas estão corretas
- e) Somente II e IV estão corretas

34) A Lei nº 14.021, de 7 de julho de 2020 dispõe sobre medidas de proteção social para prevenção do contágio e da disseminação da Covid-19 nos territórios indígenas; cria o Plano Emergencial para Enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas; estipula medidas de apoio às comunidades quilombolas, aos pescadores artesanais e aos demais povos e comunidades tradicionais para o enfrentamento à Covid-19; e altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a fim de assegurar aporte de recursos adicionais nas situações emergenciais e de calamidade pública. O Artigo 5º trata da execução de ações específicas para garantir, com urgência e de forma gratuita e periódica, as seguintes estratégias, entre outras.

- I - Garantir o acesso a testes rápidos e RT-PCRs, a medicamentos e a equipamentos médicos adequados para identificar e combater a COVID-19 nos territórios indígenas;
- II - A contratação emergencial de profissionais da saúde para reforçar o apoio à saúde indígena;
- III - A construção emergencial de hospitais de campanha nos Municípios próximos das aldeias ou comunidades com maiores números de casos de contaminação por COVID-19;
- IV - O financiamento e construção de habitações para indígenas que sofreram impacto causado pela pandemia de COVID-19.

Marque a alternativa, CORRETA quanto as afirmativas verdadeiras e falsas:

- a) V, F, V, F
- b) F, V, V, V
- c) V, F, V, V
- d) V, V, F, V
- e) V, V, V, F

35) Ainda sobre a referida Lei (nº 14.021), em seu capítulo III, que trata da segurança alimentar e nutricional destas comunidades, fica instituída a garantia da segurança alimentar e nutricional aos povos indígenas, às comunidades quilombolas, aos pescadores artesanais e aos demais povos e comunidades tradicionais enquanto perdurar o estado de emergência decorrente da pandemia da Covid-19. Deste modo, analise as afirmações abaixo:

I - A União disponibilizará remédios, itens de proteção individual e materiais de higiene e de desinfecção, observados os protocolos de proteção dos profissionais e dos povos indígenas;

II - Os atos de distribuição de cestas básicas e de outros produtos relacionados às medidas de enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas, nas comunidades quilombolas e nos territórios de pescadores artesanais e de povos e comunidades tradicionais serão realizados pelo Poder Público e entidades privadas, com a participação das comunidades interessadas;

III - A União garantirá suporte técnico e financeiro à produção dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, dos pescadores artesanais e dos demais povos e comunidades tradicionais e ao escoamento da produção daqueles prejudicados em função da COVID-19, por meio da aquisição direta de alimentos no âmbito dos programas da agricultura familiar, assegurando a infraestrutura e a logística necessárias, de acordo com cada região.

Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Somente I e III estão corretas b) Somente I e II estão corretas c) Somente II e III estão corretas
d) Todas estão corretas e) Todas estão incorretas

36) A terceira edição do Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde descreve o botulismo como uma doença neuromuscular grave, não contagiosa, resultante da ação de toxinas produzidas pela bactéria *Clostridium botulinum*, que se apresenta nas formas de botulismo alimentar, botulismo por ferimentos e botulismo intestinal e caracteriza-se por manifestações neurológicas e/ou gastrointestinais. Quanto ao seu modo de transmissão, os alimentos mais comumente envolvidos são:

I - Conservas vegetais, principalmente as artesanais (palmito, picles, pequi);

II - Produtos cárneos cozidos, curados e defumados de forma artesanal (salsicha, presunto, carne frita conservada em gordura – “carne de lata”);

III - Pescados defumados e in natura;

IV - Queijos e pasta de queijos;

V - Raramente, alimentos enlatados industrializados.

Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Alternativa I b) Alternativa II c) Alternativa III d) Alternativa IV e) Alternativa V

37) O Botulismo por ferimentos é uma das formas mais raras da doença e é ocasionado pela contaminação de ferimentos com *C. botulinum*, que, em condições de anaerobiose, assume a forma vegetativa e produz toxina in vivo. Sobre as principais portas de entrada para os esporos, marque a alternativa INCORRETA:

- a) Esmagamento de membro
b) Infecções dentárias
c) Agulhas em usuários de drogas injetáveis
d) Uso terapêutico ou estético da toxina botulínica
e) Ferimentos em áreas profundas e muito vascularizadas

38) O mesmo Manual descreve a Febre tifoide como sendo uma doença bacteriana aguda, de distribuição mundial, associada a baixos níveis socioeconômicos, principalmente em áreas com precárias condições de saneamento, higiene pessoal e ambiental. Quanto ao agente etiológico causador desta enfermidade, assinale a alternativa CORRETA:

- a) *Salmonella bongori*, sorotipo Typhi (S. Typhi), que se caracteriza por ser um bacilo gram-negativo da família Enterobacteriaceae
b) *Salmonella bongori*, sorotipo Typhi (S. Typhi), que se caracteriza por ser um bacilo gram-positivo da família Enterobacteriaceae
c) *Salmonella enterica*, sorotipo Typhi (S. Typhi), que se caracteriza por ser um bacilo gram-positivo da família Enterobacteriaceae
d) *Salmonella enterica*, sorotipo Typhi (S. Typhi), que se caracteriza por ser um bacilo gram-negativo da família Enterobacteriaceae
e) *Salmonella subterranea*, sorotipo Typhi (S. Typhi), que se caracteriza por ser um bacilo gram-negativo da família Enterobacteriaceae

39) O Manual de vigilância, prevenção e controle de zoonoses do Ministério da Saúde, dispõe sobre as normas técnicas e operacionais que nortearão as ações e os serviços públicos de saúde a serem desenvolvidos e executados no Brasil para a prevenção, a proteção e a promoção da saúde humana, quando do envolvimento de riscos de transmissão de zoonoses e de ocorrência de acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos, de relevância para a saúde pública. Segundo suas diretrizes, a raiva é uma zoonose viral que se caracteriza como uma encefalite progressiva aguda e letalidade de aproximadamente 100%, considerando casos raros de cura. Quanto as ações de vigilância e prevenção da doença que devem ser executadas em áreas com circulação de variante do vírus rábico de animais silvestres, analise as afirmativas abaixo:

I - Realização de medidas de educação em saúde, com ênfase no cuidado para evitar contato com morcegos, tanto de pessoas como de cães e gatos, e no esclarecimento quanto à gravidade da doença e à disponibilidade de medidas de prevenção;

II - Em caso de adentramento de animais silvestres (saguís, guaxinins, canídeos silvestres, entre outros), avaliar a situação e, se necessário, contatar o órgão competente para a realização da eutanásia compulsória do animal. Orientar ainda as pessoas expostas a não manipularem o animal e para procurarem o atendimento médico para iniciar o tratamento pós-exposição;

III - Enviar amostras do sistema nervoso central (SNC) de cães e gatos (que tiveram contato com o animal silvestre suspeito) com sintomatologia compatível com a doença, que vierem a óbito ou que forem submetidos à eutanásia, para o laboratório de diagnóstico, e determinar, periodicamente, as áreas de risco. Esses procedimentos devem ser realizados por profissional habilitado, de acordo com técnicas de biossegurança e legislação vigente.

Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Somente I e III estão corretas
- b) Somente I e II estão corretas
- c) Somente II e III estão corretas
- d) Todas estão corretas
- e) Todas estão incorretas

40) Ainda segundo o mesmo Manual, em relação as várias medidas de controle em áreas com circulação das variantes do vírus rábico de cães e gatos (AgV1 ou AgV2), analise as seguintes ações:

I – Em havendo um animal com diagnóstico clínico ou laboratorial positivo para raiva: deve-se realizar a investigação epidemiológica, o controle e o bloqueio de foco de cães e/ou gatos;

II – Realizar medidas de educação em saúde, focando a gravidade da doença; o cuidado com cães soltos e livres nas ruas, ferimentos causados por cão e gato e vacinação dos animais;

III - Em havendo um caso humano (por variante de cão ou gato), acompanhar a vigilância epidemiológica do caso e realizar a investigação epidemiológica para a quantificação de casos de animais, contatos e suspeitos;

IV – Realizar a vacinação antirrábica, em massa, de cães e gatos domiciliados;

V- Quaisquer cães ou gatos suspeitos de raiva devem ser observados por trinta dias em local adequado, isolado, com comida e água.

Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Somente I, II e V estão corretas
- b) Somente I, II e III estão corretas
- c) Somente II, III e V estão corretas
- d) Todas estão corretas
- e) Todas estão incorretas

RASCUNHO

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Nome: _____ Carteira nº _____